

TRASTORNOS HEMODINAMICOS

La hemorragia puede ser externa o quedar contenida dentro de un tejido

Hematoma.- Acumulación de sangre dentro de un tejido

***Petequias:** Hemorragias diminutas (1 a 2 mm) en la piel, membranas mucosas o superficies serosas. Debido a una presión intravascular aumentada, trombocitopenia, función plaquetaria defectuosa o deficiencia de los factores de coagulación.



***Púrpura:** Hemorragias ligeramente mayores (2 mm a 1 cm). Se puede asociar a las causas anteriores, traumatismos, vasculitis o aumento de la fragilidad vascular.



***Equimosis:** Hematomas subcutáneos mayores (1 a 2 cm). En estas situaciones los eritrocitos son degradados y fagocitados por los macrófagos; posteriormente, la hemoglobina se convierte en bilirrubina y finalmente en hemosiderina, reflejando los cambios de color característicos de un hematoma.




TROMBOSIS.

- Tríada de Virchow




MORFOLOGÍA.

- Líneas de Zahn.




Edema Agudo de Pulmón




CONGESTION PASIVA CRONICA


Hígado en “nuez moscada”







EDEMA Y CONGESTION AGUDA PULMONAR



CONGESTION PASIVA CRONICA CELULAS DE ICC




Trombosis de art. coronaria






Tromboembolismo sistémico



E. grasa



E. gaseosa. Enf de los buzos



E. séptico

Infarto pulmonar

