FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ASIGNATURA: GENÉTICA

UNIDAD 4: ALTERACIONES
GENÉTICAS

Mutaciones

Karina Paredes Páliz PhD.

Unach

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Libres por la Ciencia y el Saber

Mutaciones

- La definición que dio De Vries (1901) de la **mutación** era la de cualquier cambio heredable en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregación o recombinación.
- La definición de mutación a partir del conocimiento de que el material hereditario es el ADN y de la propuesta de la Doble Hélice para explicar la estructura del material hereditario (Watson y Crick,1953), sería que una mutación es **cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN.**

La **mutación** es la **fuerza primaria de variabilidad genética** en las poblaciones, mientras que la **recombinación** al crear nuevas combinaciones a partir de las generadas por la mutación, es la fuente secundaria de variabilidad genética.

MUTACIÓN SOMÁTICA Y MUTACIÓN EN LA LÍNEA GERMINAL

- **Mutación somática:** afecta a las células somáticas del individuo. Como consecuencia aparecen individuos *mosaico* que poseen dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que derivan de ella por divisiones mitóticas heredarán la mutación (herencia celular).
- Un individuo mosaico originado por una mutación somática posee un grupo de células con un genotipo diferente al resto, cuanto antes se haya dado la mutación en el desarrollo del individuo mayor será la proporción de células con distinto genotipo. En el supuesto de que la mutación se hubiera dado después de la primera división del cigoto (en estado de dos células), la mitad de las células del individuo adulto tendrían un genotipo y la otra mitad otro distinto. **Las mutaciones que afectan solamente a las células de la línea somática no se transmiten a la siguiente generación.**

Normal cell with 46 chromosomes

missing X
chromosome

Cell missing a chromosome

U.S. National Library of Medicine

Chromosomal
Mosaicism

EJEMPLOS DE MOSAICISMO

- **SÍNDROME DE DOWN MOSAICO:** Un hombre o una mujer con un porcentaje celular normal (46, XX ó 46, XY) más una línea celular anormal (47, XX, +21 ó 47, XY, +21).

Mutaciones en la línea germinal: afectan a las células productoras de gametos apareciendo gametos con mutaciones. Estas mutaciones se transmiten a la siguiente generación y tienen un mayor importancia desde el punto de vista evolutivo.

Mutaciones en las líneas somáticas y germinales

NIVELES MUTACIONALES: Tipos de mutación según el mecanismo causal

Es una clasificación de las mutaciones basada en la cantidad de material hereditario afectado por la mutación:

- **Mutación génica:** mutación que afecta a un solo gen.
- **Mutación cromosómica:** mutación que afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes.
- **Mutación genómica:** mutación que afecta a cromosomas completos (por exceso o por defecto) o a juegos cromosómicos completos.

ADN (una cadena)

Normal

Cambio en una base individual

Adición

Supresión

Secuencia de ADN (= gen)

mutación génica

Secuencia de ADN mutada

Ejemplo de mutación cromosómica: translocación

MUTACIONES GÉNICAS

- **Sustituciones de bases:** cambio o sustitución de una base por otra en el ADN.
- **Transiciones:** La sustitución de una base púrica por otra base púrica ($A \Leftrightarrow G$), o una base pirimidínica por otra base pirimidínica ($C \Leftrightarrow T$).
- **Transversiones:** sustitución de una purina (dos anillos) por una pirimidina (un anillo) o viceversa.
- **Inserciones o adiciones y deleciones** de nucleótidos.

Mutaciones génicas

TIPO DE MUTACIÓN	CONSECUENCIAS							
SIN MUTACIÓN	ADN ARNm Proteína Símil lingüístico	GAT CUA Leu dos	GGT CCA Pro por	CGT GCA Ala dos	CAG GUC Val son	ACG UGC Cys más	TCT AGA Arg que	TGT ACA Thr uno
TRANSICIÓN	ADN ARNm Proteína Símil lingüístico	GAT CUA Leu dos	GGT CCA Pro por	CGT GCA Ala dos	CGG GCC Ala sen	ACG UGC Cys más	TCT AGA Arg que	TGT ACA Thr uno
TRANSVERSIÓN	ADN ARNm Proteína Símil lingüístico	GAT CUA Leu dos	GGT CCA Pro por	CGT GCA Ala dos	CCG GGC Gly sin	ACG UGC Cys más	TCT AGA Arg que	TGT ACA Thr uno
INSERCIÓN	ADN ARNm Proteína Símil lingüístico	GAT CUA Leu dos	GGT CCA Pro por	CGT GCA Ala dos	TCA AGU Ser sso	GAC CUG Leu nmá	GTC CAG Gln squ	TTG T AAC A Asn eun o
DELECIÓN	ADN ARNm Proteína Símil lingüístico	GAT CUA Leu dos	GGT CCA Pro por	CGT GCA Ala dos	CAG GUC Val son	ACT UGA Stop	CTT GAA	GT CA

Es importante aclarar el concepto de **mutación silenciosa**, una mutación silenciosa es cualquier alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN que no produce cambio en el fenotipo estudiado.

Imaginemos que la característica externa o fenotipo analizado es simplemente la función de un enzima, es evidente que existen mutaciones en la secuencia de nucleótidos del ADN que no producen cambios en la secuencia de aminoácidos, pero también hay mutaciones en el ADN que producen cambios en la secuencia de aminoácidos que no alteran la función del enzima analizado. Ambas tipos de mutaciones son silenciosas, ya que **ninguna altera la función del enzima.**

Tipos de mutaciones génicas	Resultados y ejemplos
En el ADN	En el ADN
Transiciones	Pu→Pu o Pi→Pi: AT→GC, GC→AT, CG→TA y TA→CG
Transversiones	Pu→Pi o Pi→Pu: AT→CG, AT→TA, GC→TA, GC→CG, TA→GC, TA→AT, CG→AT y CG→GC
En la proteína	En la proteína
Mutación silenciosa	Tripletes que codifican para el mismo aminoácido: AAG(arg)→CGG(arg)
Mutación neutra	Tripletes que codifican para aminoácidos equivalentes distintos. AAA(lys)→AGA(arg). Ambos son aminoácidos básicos
Mutación cambio de sentido	Aparece un nuevo triplete que codifica para un aminoácido de distinto tipo. La proteína pierde su función.
Mutación sin sentido	Aparece un triplete de terminación o FIN: CAG(gln)→UAG(FIN)
Mutación cambio de fase o pauta de lectura	Adición o deleción de un único par de nucleótidos o de varios pares de nucleótidos, siempre que no sean múltiplo de tres.

MUTACIONES CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES

- Son alteraciones de la secuencia de genes dentro de un cromosoma.
- **Reordenamientos cromosómicos:** implican cambios en la estructura de los cromosomas (duplicación, deleción, inversión, traslocación y formación de cromosomas en anillo).

Types of mutation

Ejemplo de inversión: Cariotipo con una inversión en uno de los cromosomas del par 10.

MUTACIONES GENÓMICAS O NUMÉRICAS

- **Poliploidía:** Es la mutación que consiste en el aumento del número normal de “juegos de cromosomas” . Los seres poliploides pueden ser autopoliploides, si todos los juegos proceden de la misma especie, o alopoliploides, si proceden de la hibridación, es decir, del cruce de dos especies diferentes.
- **Haploidía:** Son las mutaciones que provocan una disminución en el número de juegos de cromosomas.
- **Aneuploidía:** Son las mutaciones que afectan solo a un número de ejemplares de un cromosoma o más, pero sin llegar a afectar al juego completo. Las aneuploidías pueden ser monosomías, trisomías, tetrasomías, etc, cuando en lugar de dos ejemplares de cada tipo de cromosomas, que es lo normal, hay o solo uno, o tres, o cuatro, etc.

Aneuploidía

La alteración en el número de cromosomas es denominada aneuploidía. La aneuploidía se define como la pérdida o ganancia de cromosomas completos en un individuo. Este fenómeno puede ocurrir en cualquiera de los cromosomas autosómicos (del 1 al 22) o sexuales (X e Y).

La ganancia de un cromosoma completo en una célula es denominada **trisomía**($2n+1$), y en ese caso el cariotipo del individuo estaría formado por 47 cromosomas. Probablemente la trisomía más conocida sea el **Síndrome de Down** (trisomía del cromosoma 21). La pérdida de un cromosoma es denominada **monosomía**($2n-1$) y el número de cromosomas de cada célula sería 45. La única monosomía viable en los humanos es la del cromosoma X, que origina en los individuos que la padecen el **Síndrome de Turner**.

Entre las aneuploidías podemos encontrar diferentes tipos de trastornos genéticos en humanos como pueden ser:

Trisomía 21
o **Síndrome de Down**
que tienen 47
cromosomas.

Trisomía 18
o **Síndrome de
Edwards**. También
tienen 47 cromosomas.

Trisomía 13
o **Síndrome de Patau**.

Monosomía X
o **Síndrome de Turner**.

Trisomía sexual XXX
o **Síndrome del triple
X**.

Trisomía sexual XXY
o **Síndrome de
Klinefelter**.

Trisomía sexual XYY
o **Síndrome del doble
Y**.

SÍNDROME DE DOWN

Ideograma de una célula humana de una persona con Síndrome de Edwards, trisomía del par 18.

En las células somáticas hay un mecanismo que inactiva a todos los cromosomas X menos uno, la ganancia o pérdida de un cromosoma sexual en genoma diploide altera el fenotipo normal, dando lugar a los síndromes de **Klinefelter** o de **Turner**, respectivamente.

Síndrome de Klinefelter

- El síndrome de Klinefelter se considera la anomalía gonosómica más común en los humanos. Los afectados presentan **un cromosoma "X" supernumerario** lo que conduce a fallo testicular primario con infertilidad e hipoandrogenismo. A pesar de la relativa frecuencia del padecimiento en recién nacidos vivos, se estima que la mitad de los productos 47, XXY se abortan de manera espontánea.

Síndrome de Turner

- El síndrome de Turner o **Monosomía X es una enfermedad genética caracterizada por presencia de un solo 'cromosoma X'**. La falta de cromosoma Y determina el sexo femenino de todos los individuos afectados, y la ausencia de todo o parte del segundo cromosoma X determina la falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Esto confiere a las mujeres que padecen el síndrome de Turner un aspecto infantil e infertilidad de por vida.

Klinefelter Syndrome

Síndrome de Klinefelter

Principales características de (47,XXY)

Síndrome de Turner

MUTACIÓN ESPONTÁNEA E INDUCIDA

- **Mutación espontánea:** se produce de forma natural o normal en los individuos.
- **Mutación inducida o exógena:** se produce como consecuencia de la exposición a agentes mutagénicos químicos o físicos.

Las mutaciones génicas se producen cuando se altera la secuencia de nucleótidos del gen por causas físicas (radiaciones) o químicas.

Fig. 17-21. Los radicales oxidativos convierten la guanina en 8-oxi-7,8-dihidrodesoxiguanina, la cual a menudo se aparea en forma incorrecta con la adenina en lugar de la citosina para producir una transversión C•G→T•A.

MUTACIONES

- **La tautomería:** las bases nitrogenadas se encuentran habitualmente en su forma cetónica y con menos frecuencia aparecen en su forma tautomérica o enólica. Las formas tautoméricas o enólicas de las bases nitrogenadas (A*, T*, G* y C*) muestran relaciones de apareamiento distintas: A*-C, T*-G, G*-T y C*-A.

- El cambio de la forma normal cetónica a la forma enólica produce transiciones. Los errores en el apareamiento incorrecto de las bases nitrogenadas pueden ser detectados por la función correctora de pruebas de la ADN polimerasa III.

ERRORES EN LA REPLICACIÓN

Mecanismos de las mutaciones espontáneas : I errores de lectura durante la replicación

- **Las mutaciones de cambio de fase o pauta de lectura:** se trata de inserciones o deleciones de uno o muy pocos nucleótidos. Según un modelo propuesto por Streisinger, estas mutaciones se producen con frecuencia en regiones con **secuencias repetidas**. En las regiones con secuencias repetidas, por ejemplo, AAAAAAAAAA..., o por ejemplo, ATATATATATATAT..., durante la replicación se puede producir el deslizamiento de una de las dos hélices (la hélice molde o la de nueva síntesis) dando lugar a lo que se llama el "*apareamiento erróneo deslizado*".

- El deslizamiento de la hélice de nueva síntesis da lugar a una **adición**, mientras que el deslizamiento de la hélice molde origina una **delección**. En el gen *lac I* (gen estructural de la proteína represora) de *E. coli* se han encontrado puntos calientes (regiones en las que la mutación es muy frecuente) que coinciden con secuencias repetidas: un ejemplo es el punto caliente CTGG CTGG CTGG.

S74, S112 75 bases

CAATTCAGG **GTGGTGAATGTGAAACC**-----CGC**GTGGTGAACCAGG**

Lugar (Nº de pb)	Secuencia repetida	Nº de bases delecionadas	Sucesos
20 to 95	GTGGTGA	75	2 S74, S112
146 to 269	GCGGCGAT	123	1 S23
331 to 351	AAGCGGCG	20	2 S10, S136
316 to 338	GTCGA	22	2 S32, S65
694 to 707	CA	13	1 S24
694 to 719	CA	25	1 S56
943 to 956	G	13	1 S42
322 to 393	Ninguno	71	1 S120
658 to 685	Ninguno	27	1 S86

ADN Mitocondrial normal

.... ACCT **ACCTCCCTCACCA** AAGC - 5000 bp TTCA **ACCTCCCTCACCA** TTGG

Delección de 5000 pb

ADN Mitocondrial con delección

..... ACCA **ACCTCCCTCACCA** TTGG

Delecciones gen *lac I*

Mutaciones nucleares (autosómicas, ligadas al sexo) y mitocondriales

Enfermedades mitocondriales

Entre las enfermedades asociadas a mutaciones del DNA mitocondrial se pueden citar las siguientes:

- Neuropatía óptica hereditaria de Leber (*NOHL*). Fue la primera enfermedad donde se demostró la herencia por vía materna de un defecto en el genoma mitocondrial.
- Oftalmoplejia externa progresiva crónica (*CPEO*).
- Síndrome de Kearns-Sayre (*KSS*), una oftalmoplejia externa con complicaciones varias.
- Epilepsia mioclónica con fibras rojas de aspecto raído (*MERRF*).
- Encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios similares a apoplejía (*MELAS*).

Adicionalmente, es probable la implicación de mutaciones mitocondriales somáticas o adquiridas como uno de los factores que contribuyen al proceso de envejecimiento y a enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de Alzheimer.

Tabla I. Tipos de enfermedades genéticas y ejemplos correspondientes

<i>Tipo de enfermedad</i>	<i>Ejemplos de enfermedades</i>
Enfermedades monogénicas	
<i>Autosómica dominante</i>	Acondroplasia Neurofibromatosis tipo 1
<i>Autosómica recesiva</i>	Fibrosis quística Beta-talasemia
<i>Ligada al X</i>	Síndrome de frágil X Distrofia muscular de Duchenne
<i>Mitocondrial</i>	Neuropatía hereditaria óptica de Leber Encefalomiopatía mitocondrial
<i>Mosaicismo somático</i>	Síndrome de McCune-Albright Síndrome de Proteus
Trastornos genómicos	Síndrome de Williams-Beuren Síndrome de diGeorge/velocardiofacial Síndrome de Smith-Magenis
Anomalías cromosómicas	Síndrome de Down Síndrome de Edwards
Alteraciones de la impronta	Síndrome de Prader-Willi Síndrome de Beckwith-Wiedemann

MUTACIÓN Y CÁNCER (5)

- La mayoría de los tumores contienen varios tipos de mutaciones cromosómicas. Algunos tumores se asocian con deleciones, inversiones o translocación es específicos. Las deleciones pueden eliminar o inactivar los genes que controlan el ciclo celular.
- Las inversiones y las translocaciones pueden causar rupturas en los genes supresores de tumores, fusionar genes que producen proteínas cancerígenas o mover genes a nuevas ubicaciones, donde quedan bajo la influencia de diferentes secuencias reguladoras.

Resumen de las enfermedades humanas a nivel genético