INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE DERIVADA

NOTA:

La **pendiente de la recta** es igual a la tangente del ángulo de inclinación $m = \operatorname{tg} \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Considere que la función f es continua en x_1 y se desea definir la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de coordenadas P y sea Q otro punto sobre la gráfica $f(x)$

La **diferencia de las abscisas** (coordenadas x) de Q a P se denota Δx , de modo que:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Consideremos la **recta secante PQ** de la figura, entonces su pendiente será:

$$m_{PQ} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

De $\Delta x = x_2 - x_1$ despejemos $x_2 = \Delta x + x_1$ y reemplacemos en la ecuación anterior

$$m_{PQ} = \frac{f(\Delta x + x_1) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Ahora consideremos el punto P como punto fijo y que Q se puede mover a lo largo de la curva hacia P, es decir que Q tiende a P, es decir que Δx tiende a cero.

Entonces la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de la función en P será el **límite de la recta secante mPQ** conforme x tiende a cero.

$$m(x_1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x + x_1) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Si el límite existe

Entonces llegamos a comprender la definición geométrica de deriva.

Nota: $m = \text{tg } \alpha = \frac{dy}{dx}$

Ejemplo 1:

Encuentre una recta tangente a la parábola $y = x^2 - 1$ en el punto (2,3). Realice la gráfica y un segmento de la recta tangente en (2,3).

$$4x - y - 5 = 0$$

Consideramos la función:

$$f(x_1 + \Delta x) = x^2 - 1$$

Aplicamos la *definición de derivada* de una función en un punto

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Evaluamos la función $f(x) = x^2 - 1$ para:

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[(x_1 + \Delta x)^2 - 1] - ((x_1^2 - 1))}{\Delta x}$$

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[x_1^2 + 2x_1\Delta x + \Delta x^2 - 1] - x_1^2 + 1}{\Delta x}$$

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x_1\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x}$$

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(2x_1 + \Delta x)}{\Delta x}$$

$$m = 2x_1$$

$$m(2) = 4$$

La ecuación de la recta tangente cuando pasa por un punto (2,3) y pendiente $m = 4$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 3 = 4(x - 2)$$

$$4x - y - 5 = 0$$

Ejemplo 2:

Calcular la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de la función $f(x) = x^3 - x$ en punto $x=2$

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Evaluemos en la función $f(x_1) = x^3 - x$

$$\begin{aligned}
m &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[(x_1 + \Delta x)^3 - (x_1 + \Delta x)] - (x_1^3 - x_1)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x_1^3} + 3x_1^2\Delta x + 3x_1\Delta x^2 + \Delta x^3 - \cancel{x_1} - \Delta x - \cancel{x_1^3} + \cancel{x_1}}{\Delta x} \\
m &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3x_1^2\Delta x + 3x_1\Delta x^2 + \Delta x^3 - \Delta x}{\Delta x} \\
m &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(3x_1^2 + 3x_1\Delta x + \Delta x^2 - 1)}{\Delta x} \\
m &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3x_1^2 + 3x_1\Delta x + \Delta x^2 - 1) \\
m &= 3x_1^2 - 1 \\
m(2) &= 11
\end{aligned}$$

En el punto P(2,6) y m=11

La ecuación de la recta tangente cuando pasa por un punto (2,6) y pendiente $m = 11$

$$\begin{aligned}
y - y_1 &= m(x - x_1) \\
y - 6 &= 11(x - 2) \\
y - 11x + 22 &= 6 \\
y - 11x + 16 &= 0 \\
y &= 11x - 16
\end{aligned}$$

TEOREMAS

1. Derivada de una constante

$$f(x) = 3 \qquad \frac{dy}{dx} = 0$$

2. Derivada de una variable

$$f(x) = x \qquad \frac{dy}{dx} = 1$$

3. Derivada de una potencia

$$f(x) = x^n \qquad \frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$$