

Prerrequisito 1 Unidad 5

Paralelo B

* Este formulario registrará su nombre, escriba su nombre.

1. Escoja el orden correcto de las capas del escroto

- ☐ Piel, Dartos, Capa celular subcutánea, Fascia espermatoca externa, Cremaster, Fascia espermatoca interna, Túnica vaginal
- ☐ Dartos, Capa celular subcutánea, Fascia espermatoca externa, Piel Cremaster, Fascia espermatoca interna, Túnica vaginal
- ☐ Piel, Capa celular subcutánea, Dartos, Fascia espermatoca interna, Cremaster, Fascia espermatoca externa, Túnica vaginal
- ☐ Piel, Capa celular subcutánea, Dartos, Fascia espermatoca interna, Fascia espermatoca externa, Cremaster, Túnica vaginal

2. Son elementos del escroto, todos excepto:

- ☐ Músculo y Fascia Cremaster
- ☐ Cordón espermático, Epididimo, conducto deferente
- ☐ Plexo pampiniforme
- ☐ Orificio inguinal interno

3. En la Patología escrotal, la transluminación se presenta en: escoba lo correcto:

- ☐ varicocele
- ☐ Hematocele
- ☐ Hidrocele, Espermatocoele
- ☐ Absceso escrotal

4. En el hidrocele adquirido (no congénito) se debe tratar quirúrgicamente si existe: excepto

- ☐ Dolor, hinchazón excesiva
- ☐ Sepsis - infección
- ☐ molestia al realizar actividad física
- ☐ Hidrocele de 1 ml asintomático

5. Es todo verdadero en cuanto al espermatocele, excepto:

- ☐ Asintomático, hallazgo incidental al examen físico o auto examen
- ☐ Se originan en la cabeza del epididimo
- ☐ son lisos y esféricos y se transiluminan
- ☐ En todos los casos se deben remover quirúrgicamente

6. El varicocele puede causar problemas de fertilidad del hombre adulto?

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

7. Escoja lo falso en cuanto al varicocele

- ☐ Grado 0: Detectado en ecografía, imperceptible a la exploración
- ☐ Grado I: palpable solo en Valsalva
- ☐ Grado II: visible en valsalva
- ☐ Grado IV: no visible pero si palpable con valsalva

