UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PERIODO ACADÉMICO: 2025 1S
ASIGNATURA: QUÍMICA ORGÁNICA
PROFESOR: ALEJANDRO ORTEGA CAMINO
STALIN.ORTEGA@UNACH.EDU.EC

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.1 Reactividad de los compuestos derivados del benceno:

Posibles reacciones de los compuestos aromáticos:

1. Halogenación por radicales libres

- Sustitución
- Adición

2. Oxidación

3. Reducción

4. Formación de alquilbencenos

- Deshidrogenación
- Deshidratación
- Deshidrohalogenación.

5. Polimerización

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.1 Estructura y propiedades del benceno:

Halogenación de compuestos bencénicos:

1.- INICIACIÓN: Disociación de la molécula de halógeno

2._ PROPAGACIÓN: Formación del radical bencilo

3._ TERMINACIÓN: Agotamiento de radicales

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.1 Estructura y propiedades del benceno:

Halogenación de compuestos bencénicos:

1.- INICIACIÓN: Disociación de la molécula de halógeno

2._ PROPAGACIÓN: Formación del radical bencilo

3._ TERMINACIÓN: Agotamiento de radicales

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.1 Estructura y propiedades del benceno:

Halogenación de compuestos bencénicos:

SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA

ADICIÓN DE ALQUILBENCENOS:

(Producto de la hidrogenación de un doble enlace)

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.1 Estructura y propiedades del benceno:

OXIDACIÓN DE LOS ALQUILBENCENOS

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.1 Estructura y propiedades del benceno:

FORMACIÓN DE LOS ALQUILBENCENOS:

1. DESHIDROGENACIÓN

2. DESHIDRATACIÓN:

3. DESHIDROHALOGENACIÓN:

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.1 Estructura y propiedades del benceno:

POLIMERIZACIÓN:

La polimerización del estireno puede llevarse a cabo bajo condiciones de radicales libres, catiónicas, aniónicas o de Ziegler-Natta.

1. INICIACIÓN

2. PROPAGACIÓN

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.1 Estructura y propiedades del benceno:

POLIMERIZACIÓN:

La polimerización del estireno puede llevarse a cabo bajo condiciones de radicales libres, catiónicas, aniónicas o de Ziegler-Natta.

1. INICIACIÓN

2. PROPAGACIÓN

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.1 Estructura y propiedades del benceno:

POLIMERIZACIÓN:

La polimerización del estireno puede llevarse a cabo bajo condiciones de radicales libres, catiónicas, aniónicas o de Ziegler-Natta.

1. INICIACIÓN

2. PROPAGACIÓN

3. TERMINACIÓN

(Agotamiento de reactivo)

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas:

Hay compuestos que pueden considerarse como derivados de los hidrocarburos al sustituir uno o más hidrógenos por otros átomos o grupos de átomos que le dan a esos compuestos propiedades particulares propias de la función química que posee. El átomo o grupo de átomos causantes de tales propiedades son los llamados **grupos funcionales**.

1. ALCOHOLES:
2. FENOLES:
3. ALDEHÍDOS Y CETONAS:
 1. Aldehídos:
 2. Cetonas:
4. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
 1. SALES:
 2. ESTERES:

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas:

ALCOHOLES:

Propiedades:

1. En las estructuras de agua, metanol y metoximetano, sus ángulos de enlace son casi tetraédricos.
2. Los enlaces O-H son más cortos que los C-H.
3. La fuerza del enlace O-H es mayor que la del C-H:

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas:

ALCOHOLES:

Los alcoholes **se clasifican** en primarios, secundarios o terciarios

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas:

Nomenclatura de ALCOHOLES:

1. La nomenclatura los considera derivados de alcanos.
2. La -o se elimina y se reemplaza por -ol.

Alcano → Alcanol

3. Se elige la cadena más larga que contiene el grupo -OH.
4. Los otros sustituyentes se usan siguiendo las normas de la IUPAC para hidrocarburos.

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas:

Nomenclatura de ALCOHOLES:

La nomenclatura los considera derivados de alcanos.

La -o se elimina y se reemplaza por -ol.

Estructura	Nombre
$\text{CH}_3\text{-OH}$	Alcohol metílico (metanol)
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH}$	Alcohol etílico (etanol)
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-OH}$	Alcohol n-propílico (1-propanol)
$\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{OH}$	Alcohol alílico (2-propen-1-ol)
$\text{-CH}_2\text{OH}$	Alcohol bencílico

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas: Otras propiedades de ALCOHOLES:

Nº de Carbonos (C)	Ejemplo de Alcohol	Fórmula Molecular	Estado Físico a 25°C	Solubilidad en Agua	Reactividad Típica
1	Metanol	CH ₃ OH	Líquido	Muy alta	Fácil oxidación a formaldehído y ácido fórmico
2	Etanol	CH ₃ CH ₂ OH	Líquido	Alta	Oxidable a acetaldehído y ácido acético
3	Propanol (1-Propanol)	CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	Líquido	Moderada	Reacciona con ácidos y haluros para formar ésteres o haluros de alquilo
4	Butanol (1-Butanol)	CH ₃ (CH ₂) ₃ OH	Líquido	Baja	Oxidable, puede deshidratarse a buteno
5	Pentanol	CH ₃ (CH ₂) ₄ OH	Líquido	Muy baja	Similar a los anteriores, menor solubilidad
6–10	Hexanol - Decanol	CH ₃ (CH ₂) ₅ OH – CH ₃ (CH ₂) ₉ OH	Líquidos	Prácticamente insolubles	Deshidratación a alquenos, menor velocidad de oxidación
>10	Dodecanol, etc.	CH ₃ (CH ₂) ₁₀ CH ₂ OH	Sólido o viscoso	Insoluble	Requiere condiciones fuertes para reacciones, útil en detergentes y tensioactivos

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas: Otras propiedades de ALCOHOLES:

Nombre IUPAC	Nombre común	Fórmula	Pf (°C)	Pe (°C)	Densidad (g/ml)
Metanol	Alcohol metílico	CH ₃ OH	-97	65	0,79
Etanol	Alcohol etílico	CH ₃ CH ₂ OH	-114	78	0,79
Propan-1-ol	Alcohol n-propílico	CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	-126	97	0,80
Propan-2-ol	Alcohol isopropílico	(CH ₃) ₂ CHOH	-89	82	0,79
Butan-1-ol	Alcohol n-butílico	CH ₃ (CH ₂) ₃ OH	-90	118	0,81
Butan-2-ol	Alcohol sec-butílico	CH ₃ CH(OH)CH ₂ CH ₃	-114	100	0,81
2-metilpropan-1-ol	Alcohol isobutílico	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ OH	-108	108	0,80
2-metilpropan-2-ol	Alcohol t-butílico	(CH ₃) ₃ COH	25	83	0,79
Pentan-1-ol	Alcohol n-pentílico	CH ₃ (CH ₂) ₄ OH	-79	138	0,82
3-metilbutan-1-ol	Alcohol isopentílico	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ CH ₂ OH	-117	132	0,81
2,2-dimetilpropan-1-ol	Alcohol neopentílico	(CH ₃) ₃ CCH ₂ OH	52	113	0,81
* Observaciones: Pf = Punto de fusión; Pe = Punto de ebullición					

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas: Reacciones para obtención de ALCOHOLES:

Hidratación catalizada de alquenos

por ácidos Se adiciona agua al enlace doble de acuerdo con la regla de Markovnikov.

Hidroboración-oxidación de alquenos

El H y el OH se adicionan al enlace doble con una regioselectividad opuesta a la de la regla de Markovnikov. Éste es un método sintético muy bueno; la adición es syn y no se observan rearrreglos.

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas: Reacciones para obtención de ALCOHOLES:

Hidrólisis de halogenuros de alquilo

Una reacción útil sólo con sustratos que no experimentan eliminación con facilidad. Rara vez se usa para la síntesis de alcoholes, ya que los halogenuros de alquilo por lo normal se preparan a partir de alcoholes.

Reacción de reactivos de Grignard con

aldehídos y cetonas Un método que permite la preparación de alcoholes con formación de nuevos enlaces carbono-carbono. Pueden prepararse alcoholes primarios, secundarios y terciarios.

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas: Reacciones para obtención de ALCOHOLES:

Hidrólisis de halogenuros de alquilo

Una reacción útil sólo con sustratos que no experimentan eliminación con facilidad. Rara vez se usa para la síntesis de alcoholes, ya que los halogenuros de alquilo por lo normal se preparan a partir de alcoholes.

Reacción de reactivos de Grignard con

aldehídos y cetonas Un método que permite la preparación de alcoholes con formación de nuevos enlaces carbono-carbono. Pueden prepararse alcoholes primarios, secundarios y terciarios.

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

3.2 Funciones Orgánicas: Reacciones para obtención de ALCOHOLES:

Reacción de reactivos de organolitio con aldehídos y cetonas Los reactivos de organolitio reaccionan con aldehídos y cetonas en una manera similar a la de los reactivos de Grignard para formar alcoholes.

Reacción de reactivos de Grignard con ésteres Produce alcoholes terciarios en los que dos de los sustituyentes en el carbono que lleva el hidroxilo se derivan del reactivo de Grignard.

Tercera Unidad: Hidrocarburos aromáticos

Producción biológica de ALCOHOLES: