45. Calcular, mediante coordenadas cartesianas, las siguientes integrales:

(a) $\iint_D dx dy$ siendo $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, y + x \leq 1, y \geq 0 \right\}$

Observando el dibujo, lo más cómodo es parametrizar el recinto de la siguiente forma

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0 \leq y \leq 1 - x \end{cases}$$

Así nuestra integral resulta

$$\iint_D dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\int_0^{1-x} dy \right] dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (1-x) dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

Este valor coincide además con el área del recinto (puedes calcularla con las fórmulas básicas de cálculo de áreas de figuras regulares, pues el recinto está formado por un triángulo y un rectángulo); pero esto ya lo sabíamos, porque una el área de un recinto D es precisamente $\iint_D dx dy$

$$(b) \iint_D x^3 y \, dx dy \text{ siendo } D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, y + x \leq 1, y \geq 0 \right\}$$

Como el recinto es el mismo, parametrizamos de igual forma la integral (sólo cambia el integrando)

$$\iint_D x^3 y \, dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\int_0^{1-x} x^3 y \, dy \right] dx$$

Realizamos primero la integral indefinida respecto de la variable y y calculando una primitiva

$$\int x^3 y \, dy = x^3 \int y \, dy = x^3 \frac{y^2}{2}$$

Así nuestra integral resulta

$$\begin{aligned} \iint_D x^3 y \, dx dy &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\int_0^{1-x} x^3 y \, dy \right] dx = \int_0^{\frac{1}{2}} x^3 \left. \frac{y^2}{2} \right|_0^{1-x} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} x^3 \frac{(1-x)^2}{2} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} x^3 (1-x)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} (x^3 - 2x^4 + x^5) dx = \left. \frac{x^4}{8} - \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{12} \right|_0^{\frac{1}{2}} = \\ &= \frac{1}{2^4 \cdot 8} - \frac{1}{2^5 \cdot 5} + \frac{1}{2^6 \cdot 12} = \frac{11}{2^8 \cdot 15} = \frac{11}{3840} \end{aligned}$$

(c) $\iint_D \frac{x}{y} dx dy$ siendo $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy \leq 16, x \geq y, x - 6 \leq y, x \geq 0, y \geq 1\}$

En esta ocasión hemos dividido el recinto en dos como se ve en el dibujo para tomar con referencia fija la variable y , quedando la variable x acotada entre dos funciones de y . Así resultan integrales que se pueden resolver. Si hubiésemos invertido los papeles de las variables (la x entre valores fijos y la variable y acotada entre funciones de x , necesitamos 3 recintos diferentes y las integrales resultantes tienen un poco más de dificultad, pero también salen)

Así los recintos parametrizados son:

$$D_1 \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ y \leq x \leq y + 6 \end{cases} \quad D_2 \begin{cases} 2 \leq y \leq 4 \\ y \leq x \leq \frac{16}{y} \end{cases}$$

Así nuestra integral queda:

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} \frac{x}{y} dx dy + \iint_{D_2} \frac{x}{y} dx dy &= \int_1^2 \left[\int_y^{y+6} \frac{x}{y} dx \right] dy + \int_2^4 \left[\int_y^{\frac{16}{y}} \frac{x}{y} dx \right] dy = \\ &= \int_1^2 \left. \frac{1}{y} \frac{x^2}{2} \right|_y^{y+6} dy + \int_2^4 \left. \frac{1}{y} \frac{x^2}{2} \right|_y^{\frac{16}{y}} dy = \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_1^2 \frac{(y+6)^2}{y} dy - \int_1^2 \frac{y^2}{y} dy \right] + \frac{1}{2} \left[\int_2^4 \frac{(\frac{16}{y})^2}{y} dy - \int_2^4 \frac{y^2}{y} dy \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_1^2 \left(y + 12 + \frac{36}{y} \right) dy - \int_1^2 y dy \right] + \frac{1}{2} \left[\int_2^4 \frac{256}{y^3} dy - \int_2^4 y dy \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{2} + 12y + 36 \ln|y| \right) \Big|_1^2 - \frac{y^2}{4} \Big|_1^2 - \frac{1}{4} \left(\frac{256}{y^2} \right) \Big|_2^4 - \frac{y^2}{4} \Big|_2^4 = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{27}{2} + 36 \ln 2 \right) - \frac{3}{4} - \frac{1}{4} (16 - 64) - 3 = 15 + 18 \ln 2 \end{aligned}$$

(d) $\iint_D xye^{-y^2} dx dy$ siendo $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y, y^2 \leq x\}$

La parametrización del recinto puede ser

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq +\sqrt{x} \end{cases}$$

Por tanto esta integral se puede resolver

$$\int_1^2 \left(\int_0^{+\sqrt{x}} xye^{-y^2} dy \right) dx = \int_1^2 \left(x \int_0^{+\sqrt{x}} ye^{-y^2} dy \right) dx = \int_1^2 \left(\frac{-x}{2} \int_0^{+\sqrt{x}} (-2)ye^{-y^2} dy \right) dx =$$

$$= \int_1^2 \left(\frac{-x}{2} e^{-y^2} \Big|_0^{+\sqrt{x}} \right) dx = \frac{-1}{2} \int_1^2 x e^{-x} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 x dx = \frac{e^{-x}(1+x)}{2} \Big|_1^2 + \frac{x^2}{4} \Big|_1^2 = \frac{3-2e}{2e^2} + \frac{3}{4}$$

Donde la primitiva de la última integral se ha calculado por partes haciendo (puede comprobarlo el alumno)

$$\begin{cases} u = x \\ dv = e^{-x} \end{cases}$$

(e) $\iint_D (2x - 1)e^{x^2+y} dx dy$ siendo $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y \geq 1, x \geq \frac{1}{2}, y + x^2 \leq 1 \right\}$

Observando de nuevo el dibujo tenemos una parametrización fácil del recinto

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \\ 1-x \leq y \leq 1-x^2 \end{cases}$$

Así nuestra integral quedaría

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\int_{1-x}^{1-x^2} (2x-1)e^{x^2+y} dy \right) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1)e^{x^2} \int_{1-x}^{1-x^2} e^y dy) dx =$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1)e^{x^2} e^y]_{1-x}^{1-x^2}) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1)e^{x^2} e^{1-x^2} dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1)e^{x^2} e^{1-x} dx =$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1)e^{x^2+1-x^2} dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1)e^{x^2+1-x} dx =$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1)e dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1)e^{x^2+1-x} dx =$$

$$e \int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 ((2x-1)e^{x^2+1-x} dx =$$

$$e (x^2 - x)]_{\frac{1}{2}}^1 - e^{x^2+1-x}]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{-3e}{4} + e^{\frac{3}{4}}$$

(f) $\iint_D y \, dx \, dy$ siendo $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq 0, (x - 1)^2 + y^2 \leq 1, (x - 2)^2 + y^2 \leq 1\}$

los recintos parametrizados son:

$$D_1 \begin{cases} 1 \leq x \leq \frac{3}{2} \\ 0 \leq y \leq +\sqrt{1-(x-2)^2} \end{cases} \quad D_2 \begin{cases} \frac{3}{2} \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq +\sqrt{1-(x-1)^2} \end{cases}$$

$$\iint_{D_1} y \, dx dy + \iint_{D_2} y \, dx dy = \int_1^{\frac{3}{2}} \left[\int_0^{+\sqrt{1-(x-2)^2}} y \, dy \right] dx + \int_{\frac{3}{2}}^2 \left[\int_0^{+\sqrt{1-(x-1)^2}} y \, dy \right] dx =$$

$$= \int_1^{\frac{3}{2}} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{+\sqrt{1-(x-2)^2}} dx + \int_{\frac{3}{2}}^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{+\sqrt{1-(x-1)^2}} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^{\frac{3}{2}} (-3 - x^2 + 4x) dx + \frac{1}{2} \int_{\frac{3}{2}}^2 (-x^2 + 2x) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-3x - \frac{x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_1^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} \left(-\frac{x^3}{3} + x^2 \right) \Big|_{\frac{3}{2}}^2 = \dots$$

(Termine el alumno las operaciones y así practica)