MORFINA

@CREATIVE_NURSE

solución INYECTABLE

Puede administrarse por vía

- intramuscular (IM)
- subcutánea (SC)
- intravenosa (IV)
- epidural e intratecal

La morfina es el principal alcaloide del opio. Se combina con los receptores opiáceos del cerebro y bloquea la transmisión de estímulos de dolor de forma que, incluso si la causa de dolor persiste, hace que se sienta menos dolor. También es capaz de producir otras acciones como sedación o euforia.

! Morfina 10 mg/ml solución inyectable:
Cada mililitro de solución inyectable contiene 10 mg de hidrocloruro de morfina.



ADMINISTRACIÓN BOLO IV LENTO



Tomar una ampolla de 1 ml. de cloruro mórfico al 1% (10 mg/ml) y disolver en 9 ml. de agua para inyección, suero fisiológico o glucosado al 5%. La concentración obtenida es de 1 mg/ml.

INDICACIONES

- Tratamiento del dolor intenso o postoperatorio inmediato.
- Tratamiento del dolor crónico maligno.
- Dolor asociado a infarto de miocardio.
- Disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar.
- Ansiedad ligada a procedimientos quirúrgicos.

SOBREDOSIS

- Depresión respiratoria con bradipnea
- Depresión del SNC
- Muerte por insuficiencia respiratoria
- Neumonía por aspiración

ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LA FICHA TÉCNICA

- Cima. Ficha tecnica morfina b. Braun 10 mg/ml solucion inyectable. (s. f.). Recuperado 25 de julio de 2024, de https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/42221/FichaTecnica_42221.html#2
- Morfina. Nombre comercial: Morfina braun, morfina clorhidrato, mst continus, oramorph, sevredol, zamorph, daliq (s. f.). https://www.cun.es. Recuperado 25 de julio de 2024, de https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/medicamentos/morfina
- Fernandez, R., & Garcia Mata, A. (s. f.). PROTOCOLO DE MORFINA PARENTERAL URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA. Gerencia de Atención Primaria de Ourense. Comisión de Farmacia e Terapéuticas. https://www.sergas.es/gal/documentacioTecnica/docs/Farmacia/XogoOurense/InformacioFarmacoterapeutica/sergas%3N2MorfinaParenteralPDF