



CHECKLIST

TEMA: Procedimientos de Enfermería en: Valoración de pacientes con hepatopatías

Lista de chequeo	CUMPLIMIENTO		
	Total (1)	Parcial (0.5)	Incompleto (0.1)
1. Objetivos y materiales		0,8	
2. Aspecto general del paciente, posición para valoración.		0,8	
<b>VALORACIÓN</b>			
3. Antecedentes de salud (Factores de riesgo/conductas de estilo de vida: exposición a sustancias hepatotóxicas, agentes ocupacionales, de recreación y viajes, consumo de alcohol y fármacos hepatotóxicos, prácticas sexuales. Valoración del expediente médico: padecimientos médicos pasados y actuales y antecedentes familiares) utiliza los términos comprensibles para el paciente.		0,5	
4. Identificar síntomas que sugieren hepatopatías (ictericia, malestar, debilidad, fatiga, prurito, dolor abdominal, fiebre, anorexia, aumento de peso, edema, aumento del perímetro abdominal, hematemesis, melena, hematoquecia, hematomas, cambios en la agudeza mental y la personalidad, trastornos del sueño, disminución de la libido en los hombres y amenorrea secundaria en las mujeres) utiliza los términos comprensibles para el paciente.		0,8	
<b>INSPECCIÓN</b>			
5. Inspeccionar piel, mucosas y escleróticas en busca de ictericia, y se valoran las extremidades en busca de atrofia muscular, edema y excoriación de la piel debida al rascado.		0,8	
6. Se observa la piel en busca de Petequias o áreas de equimosis, angiomas aracniformes y eritema palmar.	1		
7. Valorar el estado cognitivo (recuerdos, memoria, pensamiento abstracto) y neurológico del paciente. El personal de enfermería debe buscar la presencia de temblor generalizado, asterixis (movimientos involuntarios de las manos), debilidad y habla poco articulada.		0,7	
<b>PALPACIÓN</b>			
8. Instruye al paciente el procedimiento a realizar, pide que se descubra el abdomen y se palpa para valorar el tamaño del hígado y detectar cualquier dolor a la palpación. El explorador coloca una mano debajo de la caja torácica derecha inferior presiona hacia abajo durante la inspiración con presión leve de la otra mano.		0,9	
<b>PERCUSIÓN</b>			
9. El personal de enfermería estima el tamaño del hígado percutiendo sobre sus bordes superior e inferior. Comenzar la percusión en la línea medio claviclar derecha: Desde el tórax hacia abajo (para ubicar el borde superior del hígado). Desde el abdomen hacia arriba (para ubicar el borde inferior).	1		
10. Si el hígado es palpable, el evaluador registra su tamaño, consistencia y sensibilidad, así como si el contorno es regular o irregular.		0,7	
<b>EQUIVALENCIA TOTAL</b>			NOTA: 8,00

RUBRICA DE EVALUACIÓN:

10-9 EXCELENTE

6-5 BASICO, HAY QUE MEJORARLO


8-7 SATISFACTORIO

4-0 INSUFICIENTE, REPETIRLO

OBSERVACIONES: Indicadas en la devolución del procedimiento en el Laboratorio.

NOMBRES Y APELLIDOS/ ESTUDIANTE Jennifer Anahi Mora Peralta.

  
FIRMA ESTUDIANTE

  
Lic. Carla Calderón C.  
FIRMA DE LA DOCENTE DE LA PRÁCTICA



CHECKLIST

TEMA: Procedimientos de Enfermería en: Valoración de pacientes con hepatopatías

Lista de chequeo	CUMPLIMIENTO		
	Total (1)	Parcial (0.5)	Incompleto (0.1)
1. Objetivos y materiales		0,5	
2. Aspecto general del paciente, posición para valoración.	1		
<b>VALORACIÓN</b>			
3. Antecedentes de salud (Factores de riesgo/conductas de estilo de vida: exposición a sustancias hepatotóxicas, agentes ocupacionales, de recreación y viajes, consumo de alcohol y fármacos hepatotóxicos, prácticas sexuales. Valoración del expediente médico: padecimientos médicos pasados y actuales y antecedentes familiares) utiliza los términos comprensibles para el paciente.		0,5	
4. Identificar síntomas que sugieren hepatopatías (ictericia, malestar, debilidad, fatiga, prurito, dolor abdominal, fiebre, anorexia, aumento de peso, edema, aumento del perímetro abdominal, hematemesis, melena, hematoquecia, hematomas, cambios en la agudeza mental y la personalidad, trastornos del sueño, disminución de la libido en los hombres y amenorrea secundaria en las mujeres) utiliza los términos comprensibles para el paciente.		0,5	
<b>INSPECCIÓN</b>			
5. Inspeccionar piel, mucosas y escleróticas en busca de ictericia, y se valoran las extremidades en busca de atrofia muscular, edema y excoriación de la piel debida al rascado.	1		
6. Se observa la piel en busca de Petequias o áreas de equimosis, angiomas aracniformes y eritema palmar.	1		
7. Valorar el estado cognitivo (recuerdos, memoria, pensamiento abstracto) y neurológico del paciente. El personal de enfermería debe buscar la presencia de temblor generalizado, asterixis (movimientos involuntarios de las manos), debilidad y habla poco articulada.			0.1
<b>PALPACIÓN</b>			
8. Instruye al paciente el procedimiento a realizar, pide que se descubra el abdomen y se palpa para valorar el tamaño del hígado y detectar cualquier dolor a la palpación. El explorador coloca una mano debajo de la caja torácica derecha inferior presiona hacia abajo durante la inspiración con presión leve de la otra mano.		0,5	
<b>PERCUSIÓN</b>			
9. El personal de enfermería estima el tamaño del hígado percutiendo sobre sus bordes superior e inferior. Comenzar la percusión en la línea medio clavicular derecha: Desde el tórax hacia abajo (para ubicar el borde superior del hígado). Desde el abdomen hacia arriba (para ubicar el borde inferior).		0,5	
10. Si el hígado es palpable, el evaluador registra su tamaño, consistencia y sensibilidad, así como si el contorno es regular o irregular.		0,5	
<b>EQUIVALENCIA TOTAL</b>			NOTA: 6,1

RUBRICA DE EVALUACIÓN:

10-9 EXCELENTE


8-7 SATISFACTORIO


6-5 BASICO, HAY QUE MEJORARLO

4-0 INSUFICIENTE, REPETIRLO

OBSERVACIONES: Indicadas en la devolución del procedimiento en el Laboratorio.

NOMBRES Y APELLIDOS/ ESTUDIANTE EVELYN MELENA.

  
FIRMA ESTUDIANTE

  
Lic. Carla Calderón C.  
FIRMA DE LA DOCENTE DE LA PRÁCTICA

- No relevé los signos y síntomas según el caso
- Falta valoración de expediente médico, antecedentes familiares, personales
- Falta valorar agudeza mental, estado cognitivo y neurológico